Dr. med. dent. Viktor BOCHEV MPH
und das Praxisteam

Verhalten nach einem chirurgischen Eingriff

- Essen Sie erst, wenn die Anästhesie abgeklungen ist.
  Sie würden es nicht spüren, wenn Sie sich auf die betäubte Zunge, Wange und /oder Lippe beißen

- Trinken Sie bitte in den ersten Stunden nur klares Wasser- Milchprodukte -Kaffe und Schwarztee sind zu meiden.

- Rauchen Sie nicht, Nikotin verzögert die Wundheilung und führt häufig zu schmerzhaften Wundheilungsstörungen.

- Kühlen Sie die Wundregion, am besten mit einem feucht kalten Tuch.
  Kein Eis verwenden, dies führt zu verstärkter Durchblutung und damit größerer Schwellung

- Eine geringe Nachblutung ist normal. Auf keinen Fall spülen oder wiederholt ausspucken! Sie sollten bei einer störenden Nachblutung für 15-20 Minuten auf ein sauberes Taschentuch, das Sie aufgerollt auf die Wundregion aufbringen, aufbeißen.

- Reinigen Sie regelmäßig Ihre Zähne, sparen Sie das Wundgebiet aber bis zur Nahtentfernung aus.

- Schonen Sie sich für die ersten Tage nach dem Eingriff. Körperliche Betätigung (Sport) führt zu vermehrter Durchblutung und damit zu größerer Schwellung.

- Wenn Sie einen Tupfer auf die Wunde gelegt bekommen haben spätestens nach 20 Minuten entfernen

- Bitte halten Sie auch die vereinbarten Kontrolltermine ein.

Bei Komplikationen rufen Sie uns an Tel.: 07223/26369

Ihr Praxisteam

Lauferstr.8 77833 Ottersweier – Tel. 07223-2 63 69 – info@zahnarzt-ottersweier.de